



COEPIA I. racemosa, II. eriantha.

## 14. COUEPIA I. racemosa, II. eriantha.

[MARTIUS, KARL FRIEDRICH PHILIPP VON \(1794-1868\)](#)

### Description

Famille des Chrysobalanaceae

### Informations

#### Extrait:

[FLORA BRASILIENSIS : ENUMERATIO PLANTARUM IN BRASILIA HACTENUS DETECTARUM QUAS SUIS ALIORUMQUE BOTANICORUM STUDIIS DESCRIPTAS ET METHODO NATURALI DIGESTAS PARTIM ICONE ILLUSTRATAS. VOLUMEN XIV, PARS II, ROSACEAE, COMBRETACEAE, CRASSULACEAE, DROSERACEAE, ESCALLONIEAE, CUNONIACEAE, ESCALLONIEAE, CUNONIACEAE, CONNARACEAE, AMPELIDEAE, TROPAEOLACEAE, MOLLUGINACEAE, ALSINACEAE, SILENACEAE, PORTULACACEAE, FICOIDACEAE, ELATINACEAE, PHYTOLACCACEAE, NYCTAGINEAE \(APRÈS INDEX\)](#)

#### Provenances:

Service commun de la documentation de l'Université Toulouse III Paul Sabatier

#### Type de contenu - document:

Image - Dessin, estampe, peinture

#### Base:

Bibliothèque numérique Manioc

#### Format:

image/jpeg

### Mots clés

[FLORE](#)

[BRÉSIL](#)

### Conditions d'utilisation

Domaine public

### Citer ce document

Martius Karl Friedrich Philipp von, "14. COUEPIA I. racemosa, II. eriantha.", . Extrait de: *Flora brasiliensis : enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas. Volumen XIV, Pars II, Rosaceae, Combretaceae, Crassulaceae, Droseraceae, Escallonieae, Cunoniaceae, Escallonieae, Cunoniaceae, Connaraceae, Ampelideae, Tropaeolaceae, Molluginaceae, Alsinaceae, Silenaceae, Portulacaceae, Ficoidaceae, Elatinaceae, Phytolaccaceae, Nyctagineae, , , après index.* Bibliothèque numérique Manioc consulté le 28 décembre 2024. Lien:

[HTTP://WWW.MANIOC.ORG/IMAGES/TLS17090-026111](http://www.manioc.org/images/tls17090-026111).

© Manioc 2022 - Tous droits réservés